

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is vitamine K concentraat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is vitamine K en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vitamine K is een vitamine.

Vitamine K wordt gebruikt voor:

- Behandeling van een overdosering met bepaalde bloedverdunders (acenocoumarol, fenprocoumon)
- Voorkomen en behandelen van bloedingen bij volwassenen die te weinig vitamine K hebben
- Voorkomen van bloedingen door een tekort aan vitamine K bij neonaten en prematuren
- Aanvullen van vitamine K bij kinderen met een aangeboren afwijking waarbij de galwegen niet (goed) zijn aangelegd (galgangatresie)
- Aanvullen van vitamine K bij kinderen met taaislijmziekte (cystic fibrose) als deze kinderen een stoornis van de lever hebben

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u G6PD-deficientie hebt (een erfelijke aandoening waarbij rode bloedcellen makkelijker beschadigd kunnen worden).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast vitamine K nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Afgeraden wordt om vitamine K gelijktijdig te gebruiken met acenocoumarol of fenprocoumon, aangezien deze middelen elkaars werking tegengaan. Als u vitamine K moet gebruiken zal de acenocoumarol of fenprocoumon tijdelijk gestopt worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vitamine K kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Vitamine K wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Vitamine K kan veilig gebruik worden tijdens het geven van borstvoeding, aangezien geen nadelige effecten op de zuigeling worden verwacht.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vitamine K heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Overdosering van bepaalde bloedverdunders (cumarinederivaten):

- Oraal: 1-5 mg per keer indien er geen tekenen van bloeding zijn, bij lichte bloeding 5-10 mg, bij ernstige bloeding max. 10 mg; zo nodig herhalen op geleide van de INR.

Voorkomen en behandelen van bloedingen bij mensen die te weinig vitamine K hebben:

- Oraal: 2-25 mg per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dosering

Voorkomen van een bloeding door een tekort aan vitamine K bij neonaten en prematuren met een geboortegewicht ≥ 1500 mg:

- Oraal: 1 mg direct na de geboorte, gevolgd door een onderhoudsdosering van 150 µg/ dag vanaf dag 8. Dit geneesmiddel is niet geschikt voor toediening van de onderhoudsdosering.

Aanvullen van vitamine K bij kinderen met een aangeboren afwijking waarbij de galwegen niet (goed) zijn aangelegd (galgangatresie):

- Oraal: kinderen vanaf 1 maand: 1 mg per dag in 1 dosis.

Aanvullen van vitamine K bij kinderen met taaislijmziekte die leverproblemen hebben:

- Oraal: 0-12 maanden: 5-10 mg per week in 1 dosis.
- Oraal: 1-18 jaar: 5-10 mg per dag in 1 dosis.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van vitamine K hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van vitamine K moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp. Na openen 3 maanden houdbaar.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.
Donker bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Vitamine K

De andere stof in dit middel is:

- Arachideolie

Hoe ziet vitamine K eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Vitamine K wordt geleverd als een druppelflacon van 10 ml. De flacon is verpakt in een doos, waarbij een doseerspuit wordt geleverd.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2018