

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is magnesiumsulfaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is magnesiumsulfaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Magnesiumsulfaat is een middel bij obstipatie.

Magnesiumsulfaat wordt gebruikt voor:

- Obstipatie

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij plotseling optredende buikpijn, bij ernstige buikpijn gepaard gaande met misselijkheid en braken, blindedarmontsteking (appendicitis) of een darmobstructie (ileus en gastro-intestinale obstructie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u een bepaalde stoornis in de prikkelgeleiding van het hart heeft, die leiden tot hartritmestoornissen (hartblok).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast magnesiumsulfaat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdige inname van magnesiumsulfaat wordt met een aantal middelen afgeraden. Hieronder volgt een overzicht van deze middelen met inname adviezen:

- Bisfosfonaten moeten tenminste 2 uur vóór het magnesiumsulfaat worden ingenomen.
- Chinolonen moeten tenminste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout worden ingenomen.
- Eltrobopag moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumsulfaat worden ingenomen.
- Integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg) moeten ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het magnesiumzout worden ingenomen.
- IJzerzouten moeten ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout worden ingenomen.
- Penicillamine en triëntine moeten ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout worden ingenomen.
- Tetracyclines moeten minstens 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumsulfaat worden ingenomen.
- Thyreomimetica moet ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumsulfaat worden ingenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Magnesiumsulfaat kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Magnesiumsulfaat gaat over in de moedermelk. Het kan, voor zover bekend, zonder bezwaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Magnesiumsulfaat heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Obstipatie:

- Via de mond (oraal): 10 tot 30 g (= 1 tot 3 g magnesium) per dag in 1 dosis in de ochtend op de nuchtere maag.

Wijze van toediening

Innemen met water of vruchtensap.

Gebruik bij kinderen en jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar

Dosering

Obstipatie:

- Via de mond (oraal): 10 tot 30 g (= 1 tot 3 g magnesium) per dag in 2 tot 4 doses.

Wijze van toediening

Innemen met water of vruchtensap.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van magnesiumsulfaat heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van magnesiumsulfaat moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Diarree
- Irritatie van de maag en de darmen
- Verhoogd magnesiumgehalte in het bloed, met soms sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is:

- Magnesiumsulfaat 7-water

De andere stof in dit middel is:

- Water voor injectie

Hoe ziet magnesiumsulfaat 7-water eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Magnesiumsulfaat wordt geleverd als flacon van 30 ml met 25 ml oplossing. Eén verpakking bevat 20 flacons.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2021