

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is SDD suspensie en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is SDD suspensie en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

SDD staat voor Selectieve Darm Decontaminatie. De SDD suspensie bevat als werkzame bestanddelen amfotericine B, tobramycinesulfaat en colistinesulfaat welke alleen in het maag- darmkanaal werkzaam zijn. De kans op een infectie neemt hierdoor af. Amfotericine B is een schimmelwerend geneesmiddel, tobramycinesulfaat is een aminoglycoside antibioticum (middel tegen bacteriële infecties) en colistinesulfaat is een antibioticum dat behoort tot de groep van polymyxinen.

SDD suspensie wordt gebruikt voor:

- Selectieve darmdecontaminatie

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u last heeft van beschadigingen van het darmslijmvlies. Hierdoor kan meer opname in het bloed van amfotericine B, tobramycinesulfaat en colistinesulfaat ontstaan.

Waarschuwingen

Gebruik van de SDD suspensie kan een tijdelijke geelkleuring van de tanden veroorzaken. Dit kan door poetsen eenvoudig verwijderd worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast de SDD suspensie nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens over het gebruik van SDD suspensie bij zwangere vrouwen bekend. De SDD suspensie dient alleen op strikte indicatie gebruikt te worden.

Borstvoeding

Het is niet bekend of amfotericine B, tobramycinesulfaat of colistinesulfaat na toediening in de moedermelk wordt uitgescheiden. De SDD suspensie dient terughoudend gebruikt te worden door zogende moeders.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De SDD suspensie heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Selectieve darmdecontaminatie:

- Oraal: 4 maal daags 10 ml.

Wijze van toediening

Voeg voor het gebruik van dit geneesmiddel eerst de Fungizone suspensie toe aan de basis voor SDD suspensie. Het volume van de SDD suspensie is nu 80 ml.

Voor het afmeten van de dosis de fles goed omschudden. Voor het afmeten van de suspensie kan een spuit gebruikt worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van de SDD suspensie hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van de SDD suspensie moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (urticaria)
- Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvlieszen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).
- Misselijkheid
- Braken
- Diarree

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp. Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer. Na het openen en toevoegen van de Fungizone, de suspensie bewaren bij kamertemperatuur gedurende maximaal 1 week. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof(fen) in dit middel zijn na het toevoegen van de Fungizone suspensie:

- Tobramycinesulfaat
- Colistinesulfaat
- Amfotericine B

De andere stoffen in dit middel zijn na het toevoegen van de Fungizone suspensie:

- Methylhydroxybenzoaat
- Propylhydroxybenzoaat
- Propyleenglycol
- Natriumsaccharine
- Natriumbenzoaat
- Natriumdisulfiet
- Dinatriumwaterstoffosfaat
- Natriumdiwaterstoffosfaat
- Kaliumchloride
- Alcohol
- Glycerine
- Carboxymethylcellulose-natrium
- Citroenzuur
- Erythrosine
- Curaçao-smaakstof
- Passievrucht-smaakstof
- Kaneelaldehyde
- Zoutzuur
- Natronloog
- Water voor injecties

Hoe ziet de SDD suspensie eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De SDD suspensie wordt geleverd als flacon van 100 ml, gevuld met 40 ml basis voor SDD suspensie. Aan de basis voor SDD suspensie moet voor gebruik eerst een flacon (40 ml) Fungizone suspensie worden toegevoegd. Het volume van de SDD suspensie is uiteindelijk 80 ml. Eén verpakking bevat 12 flacons. De nog toe te voegen Fungizone suspensie wordt niet meegeleverd met dit product.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2022