

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is kaliumchloride en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is kaliumchloride en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kaliumchloride bevat kalium, een mineraal. Mineralen en vitamines zijn nodig voor allerlei lichaamsfuncties. Ons lichaam kan deze stoffen zelf niet aanmaken. Daarom moeten we ze via ons voedsel binnenkrijgen. Als dit niet voldoende lukt kan het helpen vitamines en mineralen via medicijnen te gebruiken om de tekorten op te heffen. Meestal merkt u kaliumtekort niet of nauwelijks op. Bij een ernstig of langer durend tekort aan kalium in het lichaam kunt u last krijgen van spierslapte, duizeligheid, verwardheid en hartkloppingen. Als het kaliumtekort ernstig is, krijgt u kaliumchloride via een ader toegediend. Dit middel is geschikt voor kinderen vanaf 1 maand.

Kaliumchloride wordt gebruikt voor:

- Te laag kalium gehalte in het bloed (hypokaliëmie)

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U of uw kind heeft een te hoog kalium gehalte in het bloed, of een bepaalde ziekte die dit kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn een verminderde nierfunctie, hartfalen, uitdroging, afwijkingen van het bloed pH of onbehandelde suikerziekte (diabetes mellitus).
- U of uw kind heeft te veel chloor in het bloed (hyperchloremie).
- U of uw kind heeft een vertraagde of te trage beweging van maag en darmen (vertraagde maagdarmpassage).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u of uw kind op dit moment of in het verleden een maagzweer heeft gehad.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast kaliumchloride nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Afgeraden wordt om kaliumchloride gelijktijdig te gebruiken met Kaliumsparende plastabletten (diuretica), ACE remmers en angiotensine II remmers (spironolacton, triamteren, eplerenon, benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril,trandolapril, zofenopril, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan en valsartan). Bij combinatie met kaliumchloride kan de hoeveelheid kalium in uw bloed te hoog worden.

Polystyreensulfonzuur (Resonium): kaliumchloride en polystyreensulfonzuur werken elkaar tegen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Kaliumchloride kan veilig tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Kaliumchloride kan veilig tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Te laag kalium in het bloed:

- Via de mond (oraal): 1,5 – 6 g per dag bij een plasmakaliumconcentratie $\geq 3,0$ mmol/l en 6 – 12 g bij een plasmakaliumconcentratie tussen 2,5 – 3,0 mmol/l. De dagdosis in verdeelde doses maximaal 3 g per keer.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dosering

Te laag kalium in het bloed:

- Via de mond (oraal): Doseren op geleide plasma kalium concentratie.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van kaliumchloride hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van kaliumchloride moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Te hoog kalium gehalte in het bloed
- Misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, schade aan de maag, bloedingen, blokkade in de maag, winderigheid
- Huiduitslag, galbulten

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp. Na openen direct gebruiken.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is:

- Kaliumchloride

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Methylhydroxybenzoaat
- Pepermuntolie
- Propyleenglycol (6,1 mg/13 ml)
- Zoutzuur 2 M
- Water voor injecties

Hoe ziet kaliumchloride eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Kaliumchloride wordt geleverd als flacon van 30 ml gevuld met 13 ml oplossing. Eén verpakking bevat 20 flacons.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2023