

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is vancomycine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is vancomycine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vancomycine behoort tot een groep antibiotica die "glycopeptiden" heten.

Vancomycine wordt gebruikt voor:

- Infecties van de huid en weefsels onder de huid.
- Infecties van bot en gewrichten.
- Een infectie van de longen die "pneumonie" (longontsteking) heet.
- Infectie van de binnenbekleding van het hart (endocarditis).

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u eerder een allergische reactie heeft gehad op een geneesmiddel dat teicoplanine heet, omdat dit zou kunnen betekenen dat u ook allergisch bent voor vancomycine.
- Als u een gehoorstoornis heeft, met name als u al ouder bent (mogelijk moet u gehoortesten ondergaan tijdens de behandeling).
- Als u een nieraandoening hebt (uw bloed en nieren moeten tijdens de behandeling worden getest).

Neem tijdens de behandeling met vancomycine contact op met uw arts of apotheker

- U vancomycine gedurende een lange tijd krijgt (uw bloed, lever en nieren moeten tijdens de behandeling mogelijk worden getest).
- U een huidreactie krijgt tijdens de behandeling.
- U ernstige of langdurige diarree krijgt tijdens of na het gebruik van vancomycine; raadpleeg uw arts dan onmiddellijk, aangezien dit een signaal kan zijn van een darmzwelling (pseudomembraneuze colitis) die na behandeling met antibiotica kan optreden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast vancomycine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De volgende geneesmiddelen kunnen reageren op vancomycine:

- Geneesmiddelen gebruikt om pijn te voorkomen tijdens operaties
- Spierverslappers
- Geneesmiddelen tegen infecties veroorzaakt door bacteriën (bv polymyxine B, colistine, bacitracine, aminoglycosiden)
- Geneesmiddel tegen schimmelinfectie (amfortericine B)
- Geneesmiddel tegen tuberculose (viomycine)
- Geneesmiddel tegen kanker (cisplatine)
- Krachtige diuretica (sterke medicijnen die gegeven worden om de aanmaak van urine aan te moedigen), zoals furosemide.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Vancomycine mag tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel toegediend worden als het duidelijk nodig is. De arts kan beslissen dat u moet stoppen met borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij volwassenen en jongeren (vanaf 12 jaar en ouder)

Dosering

Infecties:

- In een ader (intraveneus) via continue toediening: 40 – 45 mg/kg lichaamsgewicht per 24 uur

Wijze van toediening

Vancomycine cassette wordt continu via een infuus in een ader toegediend.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van vancomycine hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

- Daling van de bloeddruk
- Kortademigheid, luidruchtige ademhaling (een hoog piepend geluid dat ontstaat door een belemmerde luchtstroom in de bovenste luchtweg)
- Uitslag en ontsteking van de slijmvlieslaag on de mond, jeuk, jeukende uitslag galbulten
- Nierproblemen die voornamelijk ontdekt worden via bloedonderzoek
- Roodheid van het bovenlichaam en gezicht, ontsteking van een ader.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

- Tijdelijke of permanent gehoorverlies

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

- Afname van het aantal witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes (bloedcellen die zorgen voor de bloedstolling)
- Toename van sommige witte bloedcellen in het bloed
- Evenwichtsverlies
- Oorsuizen
- Duizeligheid

- Ontsteking van een bloedvat
- Misselijkheid (misselijk gevoel)
- Ontsteking van de nieren en nierfalen
- Pijn in de borst en rugspieren
- Koorts, koud rillingen

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

- Een plotselinge aanval van een ernstige allergische huidreactie met huidafschilfering, blaarvorming of vervelling. Dit kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijnen
- Hartstilstand (plotseling verlies van hartfunctie) ontsteking van de darm die buikpijn en diarree, mogelijk met bloed erin, veroorzaakt

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Misselijk zijn (overgeven), diarree
- Verwardheid, slaperigheid, gebrek aan energie, zwelling, vasthouden van vocht, minder urine
- Uitslag met zwelling of pijn achter de oren, in de nek, lies, onder de kin en oksels (gezwollen lymfeklieren), abnormale bloed- en leverfunctietests
- Uitslag met blaren en koorts

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp. Na aansluiten 24 uur houdbaar (binnen de exp.) bij kamertemperatuur (15 - 25°C).

Vancomycine cassette is 8 dagen houdbaar in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Na aanhangen is de cassette nog 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Vancomycine (RVG nummer: 110476)

De andere stof in dit middel is:

- Natriumchloride 0,9%

Hoe ziet vancomycine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Vancomycine 500, 1000, 1500, 2000 of 2500 mg wordt geleverd in een CADD medicatiecassette van 250 ml. Eén verpakking bevat één of meer cassettes.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2024