

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is SDD drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. Wat is SDD drank en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

SDD staat voor Selectieve Darm Decontaminatie. De SDD drank bevat als werkzame bestanddelen tobramycinesulfaat en colistinesulfaat welke alleen in het maag- darmkanaal werkzaam zijn. De kans op een infectie neemt hierdoor af. Tobramycinesulfaat is een aminoglycoside antibioticum (middel tegen bacteriële infecties) en colistinesulfaat is een antibioticum dat behoort tot de groep van polymyxinen.

SDD drank wordt gebruikt voor:

- Selectieve darmdecontaminatie
- Darmchirurgie

**2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u last heeft van beschadigingen van het darmslijmvlies. Hierdoor kan meer opname in het bloed van tobramycinesulfaat en colistinesulfaat ontstaan.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast de SDD drank nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

**Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Niet van toepassing.

**Zwangerschap en borstvoeding**

**Zwangerschap**

Er zijn geen gegevens over het gebruik van SDD drank bij zwangere vrouwen bekend. De SDD drank dient alleen op strikte indicatie gebruikt te worden.

**Borstvoeding**

Het is niet bekend of tobramycinesulfaat of colistinesulfaat na toediening in de moedermelk wordt uitgescheiden. De SDD drank dient terughoudend gebruikt te worden door zogende moeders.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

De SDD drank heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

**3. Hoe gebruikt u dit middel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Dosering**

**Selectieve darmdecontaminatie:**

- Oraal: 4 maal daags 5 ml.

**Darmchirurgie:**

- Oraal: 4 maal daags 5 ml.

**Wijze van toediening**

Voor het afmeten van de drank kan een spuit gebruikt worden. De SDD drank kan eventueel met een beetje limonade ingenomen worden.

**Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u per ongeluk te veel van de SDD drank hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

**Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

**Als u stopt met het gebruik van dit middel**

De beslissing om te stoppen met het gebruik van de SDD drank moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (urticaria)
- Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvlies (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).
- Misselijkheid
- Braken
- Diarree

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. Hoe bewaart u dit middel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in deze middelen zijn:

- Tobramycine (als sulfaat)
- Colistinesulfaat

De andere stoffen in deze middelen zijn:

- Methylhydroxybenzoeaat
- Propyleenglycol
- Zoutzuur
- Natronloog
- Water voor injecties

### Hoe ziet de SDD drank eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De SDD drank wordt geleverd als flacon van 100 ml, gevuld met 40 ml of 80 ml drank. Eén verpakking bevat 12 flacons.

### Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis  
Boerhaavelaan 24  
2035 RC Haarlem  
tel.: 023-5464000

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2024**