

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is lorazepam en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is lorazepam en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lorazepam behoort tot de benzodiazepines. Het werkt rustgevend, spierontspannend en het vermindert angstgevoelens.

Lorazepam wordt gebruikt voor:

- Het voorkomen van ontwenningsverschijnselen na het stoppen van beademing met continue sedatie
- Acute angsten

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U of uw kind bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U of uw kind heeft myasthenia gravis, een aandoening waardoor uw spieren sneller verzwakken of vermoeid raken.
- U of uw kind heeft een verschrompeling van de lever (levercirrose) in combinatie met een hoge waarde van ammoniak in het bloed.
- U of uw kind heeft ernstige insufficiëntie van de ademhaling.
- U of uw kind heeft last van het slaapapneusyndroom.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u of uw kind insufficiëntie van de ademhaling heeft.
- Als u of uw kind een beschadiging van het centraal zenuwstelsel heeft.
- Als u of uw kind een historie van alcohol- of drugsgebruik heeft.

Kinderen jonger dan 1 maand

- De lorazepamdrank 0,5 mg/ml wordt afgeraden voor gebruik bij kinderen tot 1 maand vanwege de aanwezigheid van 30 mg/ml propyleenglycol.
- De veiligheid en werkzaamheid van lorazepam bij kinderen in de leeftijd tot 1 maand is nog niet vastgesteld.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast lorazepam nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Afgeraden wordt om lorazepam gelijktijdig te gebruiken met geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar.

Waarop moet u of uw kind letten met eten en drinken?

Alcohol kan het slaapverwekkende effect van dit geneesmiddel verhogen en de gebruiker zeer slaperig maken.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Lorazepam dient tijdens de zwangerschap alleen op strikte indicatie te worden gebruikt. Lorazepam dient in een zo laag mogelijke effectieve dosering en zo kort mogelijk te worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit geneesmiddel komt in de moedermelk. Lorazepam kan incidenteel worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Bijwerkingen bij de zuigeling, zoals sufheid en moeilijk drinken, zijn gemeld.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lorazepam heeft een grote invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. De belangrijkste bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid zijn sufheid, slaperigheid en duizeligheid.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen vanaf 1 maand tot 18 jaar

Dosering

Voorkoming van ontwenningsverschijnselen na het stoppen van beademing met continue sedatie:

- Via de mond (oraal): De dosering is afhankelijk van de gebruikte intraveneuze medicatie.

Wijze van toediening

De drank kan oraal worden toegediend met behulp van een spuitje.

Gebruik bij kinderen vanaf 6 jaar tot 18 jaar

Dosering

Acute angsten:

- Via de mond (oraal): 0,02-0,1 mg/kg lich.gewicht per dag in 2-3 doses. Starten met een lage beginndosis vervolgens de dosis langzaam ophogen op geleide van het klinisch beeld.

Wijze van toediening

De drank kan via de mond (oraal) worden toegediend met behulp van een spuitje.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van lorazepam hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van lorazepam moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

- Vermoeidheid

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

- Slaperigheid overdag
- Sufheid
- Duizeligheid
- Problemen met het regelen van spierbewegingen (ataxie)
- Spierzwakte

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

- Verwardheid
- Depressie
- Emotionele afvlakking
- Slaapstoornissen
- Veranderde zin in seks (libidostoornis)
- Hoofdpijn
- Verminderde alertheid
- Stoornissen in het zien (visusstoornissen)
- Dubbelzien
- Misselijkheid
- Maagdarmklachten
- Allergische huidreacties

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

- Bloedbeeldafwijkingen
- Geheugenverlies dat tot enkele uren na inname van benzodiazepinen kan optreden (anterograde amnesie bij benzodiazepinen)
- Geheugenstoornis
- Tegenstrijdige reacties (paradoxe reacties)
- Verlaagde bloeddruk (hypotensie)
- Verhoogde bloeddruk (hypertensie)
- Afwijkende leverfunctiewaarden

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp. Na openen 6 maanden houdbaar.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Lorazepam

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Polyethyleenglycol 400
- Propyleenglycol
- Essence sinaasappel
- Glycerol 85%

Hoe ziet lorazepam eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lorazepam wordt geleverd als flacon van 60 ml. Eén verpakking bevat een flacon.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2024