

Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u of uw kind voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u of uw kind.
- Krijgt u of uw kind last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is xylometazoline neusdruppels en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet uw kind er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u of uw kind dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is xylometazoline en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Xylometazoline is een middel met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympathicomimetica).

Xylometazoline wordt gebruikt bij volwassenen voor:

- Het verminderen van de zwelling van het neusslijmvlies na een operatie
- Neusbloeding

Dit middel wordt bij kinderen gebruikt voor:

- Verstopte neus door ontsteking en zwelling van het van het neusslijmvlies (congestie)

2. Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet uw kind er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken?

- Uw of uw kind kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als de hypofyse van u of uw kind met een operatie is verwijderd (transsfenoidale hypofysectomie).
- Als u of uw kind een operatie via de neus heeft gehad (transnasale operatieve ingrepen), waarbij het buitenste hersenvlies (dura mater) vrij is komen te liggen.
- Als u of uw kind een ontsteking van het neusslijmvlies met droge neus heeft (Rhinitis sicca).
- Als u of uw kind een ernstige hartvaataandoening heeft (cardiovasculaire aandoeningen).

Wanneer moet u of uw kind extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u of uw kind dit middel gebruikt.

- Als u of uw kind een aangeboren stoornis heeft in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie).
- Als u of uw kind een hoge bloeddruk heeft (hypertensie).
- Als u of uw kind een onregelmatige hartslag heeft (aritmie).
- Als u of uw kind een vergrote prostaat heeft (prostaathypertrofie).
- Als u of uw kind gezwellachtige woekeringen heeft (feochromocytoom).
- Als u of uw kind diabetes mellitus heeft.
- Als u of uw kind een verhoogde oogboldruk heeft (nauwekamerhoekglaucoom)

Kinderen zijn extra gevoelig voor xylometazoline. Xylometazoline is een tweede keuze na een oplossing met natriumchloride 0,9%.

Patiënten met hyperthyroïdie, kinderen en ouderen zijn soms zeer gevoelig voor sympathicomimetica.

Gebruikt u of uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u of uw kind naast xylometazoline nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u of uw kind letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Xylometazoline kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Xylometazoline kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. Hoe gebruikt u of uw kind dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals de arts of apotheker van u of uw kind dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Verminderen van de zwelling van het neusslijmvlies na een operatie:

- In de neus: De oplossing op een neustampon druppelen en inbrengen in de neus.

Neusbloeding:

- In de neus: Een watje of gaasje in de oplossing drenken en inbrengen in de neus.

Dosering

Kinderen van 3 maanden tot 2 jaar:

Verstopping van het neusslijmvlies (congestie):

- Voor gebruik in de neus (nasaal): 1 druppel in elk neusgat, zo nodig 1 tot 3 keer per dag. Minimaal 8 uur aanhouden tussen twee toedieningen. Gebruik gedurende maximaal 1 week.

Wijze van toediening

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik voor uw kind altijd een eigen flacon. Zo voorkomt u besmetting van een ander met bacteriën en virussen.

1. Laat uw kind voor gebruik de neus snuiten. Laat dit niet te krachtig doen, anders perst uw kind het slijm in de voorhoofdsholte of neusbijholte, waardoor deze ontstoken kunnen raken.
2. Bij een klein kind: zorg dat het kind zit of staat, met het hoofd naar achteren gebogen. Laat in elk neusgat één tot twee druppels vallen.
3. Zorg dat het kind direct daarna het hoofd naar voren buigt, naar de knieën toe. Als het kind even in deze houding blijft kan de vloeistof zich goed in de neus verspreiden.
4. Spoel de pipet na gebruik schoon met lauwwarm water en sluit de flacon goed af.

Heeft u of uw kind te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u of uw kind per ongeluk te veel van dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te nemen of aan uw kind te geven?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van xylometazoline moet worden besproken met uw arts of van uw kind. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

- Hoofdpijn
- Misselijkheid
- Branderig gevoel in neus of keel
- Droog neusslijmvlies
- Lokale irritatie

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

- Hartkloppingen
- Stoornissen in het zien (visusstoornissen)
- Overgevoeligheidsreacties, waaronder plotselinge zwelling van de Huid en slijmvlies (angio-oedeem), huiduitslag en jeuk
- Slapeloosheid
- Duizeligheid
- Onvrijwillig beven (tremor)
- Verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Gebruik in de neus (nasaal) kan niezen veroorzaken.

Een lang gebruik kan van dit middel kan blijvende roodheid, zwelling en ontsteking (rebound-congestie) geven.

Dit middel kan een aanval van stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof veroorzaken (acute porfyrie).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u of uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in deze middelen?

De werkzame stof in deze middelen is:

- Xylometazoline hydrochloride

De andere stoffen in deze middelen zijn:

- Dinatriumedetaat
- Natriumdihydrogenfosfaat-dihydraat
- Natriumchloride
- Benzalkoniumchloride
- Dinatriummonohydrogenfosfaat dodecahydraat
- Water voor injectie

Hoe ziet xylometazoline HCl neusdruppels eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Xylometazoline 0,025% middel wordt geleverd als flacon van 10 ml (inhoud is 5 ml) met een pipetmontuur. Eén verpakking bevat één flacon.

Xylometazoline 1 mg/ml wordt geleverd als flacon van 30 ml met een pipetmontuur. Eén verpakking bevat één flacon.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2024