

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is dinatriumedetaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is dinatriumedetaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dinatriumedetaat is een middel dat kalk (calcium) in het hoornvlies bindt.

Dinatriumedetaat wordt gebruikt voor:

- Kalkafzetting in het oog

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u zachte contactlenzen draagt. U dient tot minimaal 30 minuten na het druppelen van dinatriumedetaat geen zachte contactlenzen te dragen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dinatriumedetaat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van dinatriumedetaat tijdens de zwangerschap. Het is echter onwaarschijnlijk dat dinatriumedetaat na toediening in het oog in het lichaam wordt opgenomen. Dinatriumedetaat kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van dinatriumedetaat tijdens het geven van borstvoeding. Het is echter onwaarschijnlijk dat dinatriumedetaat na toediening in het oog in het lichaam wordt opgenomen. Dinatriumedetaat kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dinatriumedetaat heeft invloed op het gezichtsvermogen en daardoor ook op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Zo lang u last heeft van wazig zicht, mag u geen auto rijden.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Kalkafzetting in het hoornvlies:

- In het oog: oogwassing van 0,4% of 2% of oogdruppels van 4% worden door de oogarts toegediend.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van dinatriumedetaat hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van dinatriumedetaat moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

- Overgevoeligheid, gekenmerkt door jeuk, roodheid, zwelling en huiduitslag

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaar beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming van licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in deze middelen is:

- Dinatriumedetaat, dit wordt ook wel EDTA genoemd

De andere stoffen in deze middelen zijn:

- Benzalkoniumchloride
- Natriumchloride
- Borax
- Water voor injecties

Hoe ziet dinatriumedetaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dinatriumedetaat 0,4% wordt geleverd als flacon van 10 ml. Eén verpakking bevat 1 flacon.

Dinatriumedetaat 2% wordt geleverd als flacon van 10 ml. Eén verpakking bevat 1 flacon.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2025