

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is atropine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is atropine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Atropine ontspant de spieren van de iris en verwijdert zo de pupil. Het verhindert ook de werking van de oogspieren die nodig zijn om scherp te zien.

Atropine wordt gebruikt voor:

- Oogonderzoek bij kinderen
- Ontstekingen in het oog (intra-oculaire ontstekingen) bij kinderen

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U of uw kind heeft een vorm van glaucoom (nauwe-kamerhoekglaucoom)
- U of uw kind heeft een te hoge druk in het oog (verhoogde intracraniale druk)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat uw kind dit middel gebruikt.

- Als u of uw kind contactlenzen draagt. Draag geen zachte contactlenzen tijdens het gebruik van dit middel. Harde contactlenzen kunt u wel dragen. Neem deze voor het indruppelen uit en doe ze na 15 minuten weer in.
- Als u of uw kind dagelijkse activiteiten moet uitvoeren waarbij uw gezichtsvermogen belangrijk is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u of uw kind naast atropine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Afgeraden wordt om atropine gelijktijdig te gebruiken met middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (parasymphaticomimetica) die ook via het oog worden toegediend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

U kunt dit medicijn veilig gebruiken tijdens de zwangerschap. Er is redelijk veel ervaring met het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap. Er zijn geen aanwijzingen dat dit medicijn slecht is

voor de zwangerschap of voor de baby. Wel moet u na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dichtdrukken. Hierdoor kan er zo min mogelijk medicijn in uw bloed terecht komen.

Borstvoeding

Atropine komt in hele kleine hoeveelheden in uw bloed. Hierdoor kan er maar heel weinig in de moedermelk komen. Druk na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dicht. Hierdoor kan er zo min mogelijk medicijn in uw bloed en in de moedermelk terecht komen. Eenmalig gebruik in het oog zal waarschijnlijk geen problemen veroorzaken bij de baby.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze atropinedruppels verminderen het zicht. Rijd daarom geen auto zolang u hier last van heeft. Het effect van één druppel houdt een tot twee weken aan en neemt dan langzaam af.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dosering

Verwijding van de pupil en verlamming van de accommodatiespieren voor oogonderzoek:

Via het oog (oculair): 5 mg/ml, 1 druppel per keer, 2 maal daags gedurende 3 dagen en 1 maal een druppel voorafgaand aan het onderzoek naar de sterkteafwijking van het oog (retinoscopie).

Ontsteking in het oog

Via het oog (oculair): kinderen vanaf 4 jaar; 5 mg/ml, 1 tot 2 druppels per keer, 2 tot 3 maal per dag. Voor kortdurend gebruik.

Wijze van toediening

1. Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
2. Als u of uw kind contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het is het beste om tijdens een oogontsteking helemaal geen lenzen te dragen. Harde contactlenzen kunt u 15 minuten na het toedienen van de druppels weer indoen.
3. Verwijder eventuele schilfers en korsten van de oogleden met een watje met leidingwater.
4. Neem plaats op een stoel of een bank.
5. Schroef het dopje van het flesje en leg het dopje op de zijkant.
6. Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
7. Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
8. Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
9. Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt.
10. Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
11. Laat één druppel in het gootje vallen, knijp zo nodig in de druppelaar.
12. Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht of laat uw kind het oog dichtdoen.
13. De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het traankanaaltje in de neusholte wegliep. Druk daarom deze kanaaltjes na het indruppelen één minuut dicht. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen, net onder het bobbeltje in de hoek van uw oog.
14. Doe uw oog weer open of laat uw kind het oog open doen.
15. Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje.
16. Was uw handen nogmaals met water en zeep.

Vindt u het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhelp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u of uw kind per ongeluk te veel van atropine hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem zelf of geef uw kind geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van atropine moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Frequentie onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Grote pupillen
- Wazig zien
- Gevoeligheid voor fel licht (fotofobie)
- Prikkelend of brandend gevoel direct na het indruppelen
- Overgevoeligheid: jeuk, roodheid, zwelling van het oog of huiduitslag
- Toename van de oogdruk: neem direct contact op met een arts bij plotselinge hevige oogpijn, een rood oog en het zien van kringen rondom lichtpunten
- Allergische reacties
- Ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis)
- Ophoping van vocht in of rond het oog, wat zwelling en wazig zicht kan veroorzaken (oogedeem)
- Ontsteking van de ooglidrand (blefaritis)
- Een te hoog gehalte van bloed in het oog (hyperemie)

De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan als het medicijn via uw ogen in uw bloed komt. Dit kun u proberen te voorkomen door na het druppelen de traankanaaltjes in de ooghoek een paar minuten dicht te drukken. Zie hiervoor de rubriek '3. Hoe gebruikt u dit middel?'. Neem contact op met uw arts als u of uw kind last heeft van een of meer van deze bijwerkingen.

Frequentie onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Hoofdpijn
- Blozen
- Droge mond, droge huid
- Hartkloppingen
- Moeilijk plassen
- Duizeligheid
- Verwardheid
- Koorts

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Atropinesulfaat(1-water)

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Dinatriumedetaat
- Benzalkoniumchloride
- Boorzuur
- Water voor injectie

Hoe ziet dexamethason eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Atropine 0,5% oogdruppels wordt geleverd als flacon van 5 ml. Eén verpakking bevat 1 flacon.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2025