

Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u of uw kind nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u of uw kind voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u of uw kind last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is aluminiumacetotartraat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet u of uw kind er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u of uw kind dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u of uw kind dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is aluminiumacetotartraat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aluminiumacetotartraat is een middel met samentrekkende werking.

Aluminiumacetotartraat wordt gebruikt voor:

- Uitwendig oorontsteking (otitis externa)

2. Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet u of uw kind er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken?

- U of uw kind bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u of uw kind extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u of uw kind dit middel gebruikt.

Aluminiumzouten kunnen kleding verkleuren en metalen (sieraden, bril) aantasten

Gebruikt u of uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u of uw kind naast aluminiumacetotartraat nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u of uw kind letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de ongeboren vrucht worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Bent u of uw kind zwanger, denkt u of uw kind zwanger te zijn, wilt u of uw kind zwanger worden of geeft u of uw kind borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u of uw kind dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

3. Hoe gebruikt u of uw kind dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u of uw kind dat heeft verteld. Twijfelt u of uw kind over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Uitwendig oorontsteking bij een gaatje in het trommelvlies (otitis externa bij trommelvliesperforatie):

- Via het oor (auriculair): 3 maal per dag 3 druppels gedurende 1 week, zo nodig 2 maal herhalen.

Gebruik bij kinderen van 1 maand tot 18 jaar

Dosering

Uitwendig oorontsteking (otitis externa):

- Via het oor (auriculair): 3 maal per dag 3 druppels gedurende 1 tot 2 weken.

Wijze van toediening

Aluminiumacetotartraat wordt in het oor gedruppeld met het pipetmontuur.

1. Verwarm het flesje vooraf even in uw handen.
2. Draai de pipetdop los van het flesje
3. Vul de pipet met de oordruppels.
4. Ga op uw zij liggen, of houd het hoofd opzij.
5. Trek het oor naar boven en naar achteren, bij kinderen jonger dan zes jaar naar onderen en naar achteren.
6. Houd de pipet boven de gehoorgang en laat de druppels in het oor vallen. Zorg dat de pipet nergens mee in aanraking komt.
7. Houd het hoofd nog drie minuten opzij of ga op uw zij liggen, zodat de druppels alle plekken van de gehoorgang kunnen bereiken.
8. Eventueel kunt u of uw kind daarna een watje in het oor doen om te voorkomen dat de vloeistof er weer uitloopt.
9. Draai direct na gebruik de pipetdop weer op het flesje.

Heeft u of uw kind te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u of uw kind per ongeluk te veel van aluminiumacetotartraat hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u of uw kind vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van dit middel moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u of uw kind nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Irritatie

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u of uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U OF UW KIND kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u of uw kind ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u of uw kind dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u of uw kind met geneesmiddelen moet doen die u of uw kind niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu of uw kind terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Aluminiumacetotartraat

De andere stof in dit middel is:

- Water voor injectie

Hoe ziet aluminiumacetotartraat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aluminiumacetotartraat wordt geleverd als flacon van 10 ml met een glazen pipetmontuur.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2026