

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u of uw kind nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u of uw kind voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u of uw kind last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is ceftriaxon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is ceftriaxon en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ceftriaxon is een middel tegen bepaalde infecties met bacteriën (antibiotica).

Ceftriaxon wordt gebruikt voor:

- Hersenvliesontsteking (bacteriële meningitis)
- Ontstekingen in de buikholte (intra-abdominale infecties)
- Longontsteking (pneumonie)
- Acute verergering van COPD
- Infecties in de buikholte
- Gecompliceerde infecties van de urinewegen (waaronder pyelonefritis)
- Infecties van botten en gewrichten
- Ernstige infecties van de huid en weke delen
- Ziekte van Lyme
- Ontsteking van de binnenzijde van het hart (bacteriële endocarditis)

2. Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u of uw kind extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u of uw kind een lever- of nierfunctiestoornis heeft.
- Als u of uw kind epilepsie heeft.
- Als u of uw kind eerder een ernstige allergische reactie heeft gehad op penicillinen.
- Als u een tekort heeft aan vitamine K heeft, of risicofactoren daarvoor heeft.
- Als u een aandoening aan de darmen heeft, zoals colitis.

Gebruikt u of uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u of uw kind naast ceftriaxon nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Afgeraden wordt om ceftriaxon gelijktijdig te gebruiken met:

- Middelen tegen trombose (cumarines).

Kinderen en jongeren van 1 maand tot 18 jaar

Afgeraden wordt om ceftriaxon gelijktijdig te gebruiken met:

- Middelen tegen trombose (cumarines).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Het lijkt dat ceftriaxon veilig gebruikt kan worden. De voorkeur gaat echter uit naar een geneesmiddel uit dezelfde groep waar meer ervaring mee is.

Borstvoeding

Dit middel kan tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt.

Bent u of is uw kind zwanger, denkt u of uw kind zwanger te zijn, wilt u of uw kind zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ceftriaxon heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u of uw kind dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Infecties:

- In een ader (intraveneus): 1 tot 2 g 1 tot 2x per dag, zo nodig verhogen tot 4 g per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren van 1 maand tot 18 jaar

Dosering

Infecties:

- In een ader (intraveneus): 100 mg/kg/dag 1x per dag, maximaal 2 gram/dag.

Wijze van toediening

De elastomeerpomp 6 uur voor toedienen uit de koelkast halen. De pomp waarin de ceftriaxon wordt geleverd zal het geneesmiddel in 30 minuten afgeven. De pomp heeft een restvolume waardoor er altijd ongeveer 3 ml oplossing in de pomp achter zal blijven.

Bij langdurige behandeling dient het bloedbeeld regelmatig gecontroleerd te worden.

Bij een stoornis aan de nieren, moet de dosering soms worden aangepast. Raadpleeg hiervoor een arts of apotheker.

Heeft u of uw kind te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u of uw kind per ongeluk te veel van ceftriaxon hebben gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u of uw kind vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van ceftriaxon moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u of uw kind nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

- Afname van het aantal witte bloedcellen (eosinofilie, leukopenie) en bloedplaatjes (trombocytopenie)
- Diarree
- Huiduitslag
- Stijging in het bloed van enzymen van de lever
- Stijging in het bloed van creatinine (afbraakproduct van spieren)

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

- Schimmelinfecties aan de geslachtsorganen
- Afname van het aantal granulocyten
- Bloedarmoede (anemie)
- Verminderde werking van stollingsfactoren in het bloed (coagulopathie)
- Koorts
- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Misselijkheid
- Braken
- Jeuk

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

- Koude rillingen
- Onwillekeurige samentrekkingen van de longen (bronchospasmen)
- Ontsteking van het slijmvlies in de darmen waarbij o.a. bloed en slijm wordt ontlast (pseudomembraneuze colitis)
- Netelroos (urticaria)
- Vochtophoping (oedeem)
- Bloed in de urine (hematurie)
- Glucose in de urine (glucosurie)
- Neerslag in de nieren en urinewegen
- Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Tekort aan rode bloedcellen (hemolytische anemie)
- Sterke verminderen of verdwijnen van bepaalde witte bloedcellen (agranulocytose)
- Allergische reacties (anafylactische of anafylactoïde reacties)
- Stuiptrekkingen (convulsies)
- Evenwichtsstoornissen (vertigo)
- Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
- Ontsteking van de tong (glossitis)
- Klachten door het ontstaan en achterblijven van een ceftriaxon-calciumzout in de galblaas
- Bepaalde vorm van geelzucht (kernicterus)
- Aandoening waarbij delen van de huid en slijmvliezen loslaten (syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse)
- Acute huiduitslag als gevolg van een infectie (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose)
- Huiduitslag met koorts en orgaanfalen (drug rash with eosinophilic and systemic symptoms)
- Verminderde urineproductie (oligurie)

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren van 1 maand tot 18 jaar kunnen voorkomen

Niet van toepassing.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u of uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Ceftriaxon (als dinatrium 2-water)

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Water voor injecties
- Natriumchloride 0,9%

Hoe ziet ceftriaxon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ceftriaxon wordt geleverd als elastomeerpomp van 100 ml. Eén verpakking bevat één of meer elastomeerpompen.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2026