

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is meropenem en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is meropenem en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Meropenem is een middel tegen bepaalde infecties met bacteriën

Meropenem wordt gebruikt voor:

- Luchtweginfecties (longontsteking, cystische fibrose)
- Gecompliceerde urineweginfecties
- Gecompliceerde infecties van huid en weke delen
- Infecties in de buikholte
- Hersenvliesontsteking

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U of uw kind is allergisch voor andere antibiotica uit dezelfde groep; carbapenems.
- Als u of uw kind eerder een ernstige allergische reactie heeft gehad op penicillinen (betalactam-antibiotica).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u of uw kind een aandoening aan de lever heeft.
- Als u of uw kind een natriumbepert dieet volgt.
- Als u of uw kind een aandoening aan de darmen heeft, zoals colitis.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast meropenem nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- Bepaalde middelen tegen epilepsie (valproïnezuur, natriumvalproaat), omdat de uitscheiding van deze middelen door meropenem wordt versneld waardoor ze niet meer werkzaam zijn.
- Probeniciden, omdat het de uitscheiding van meropenem remt.
- Bepaalde middelen tegen trombose (cumarines). Het effect van deze middelen wordt door meropenem versterkt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Het gebruik van meropenem tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.

Borstvoeding

Het gebruik van meropenem tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het effect van meropenem op de rijvaardigheid of het bedienen van machines is niet onderzocht. Meropenem kan invloed hebben op de rijvaardigheid of machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Dit middel wordt toegediend door medisch personeel.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Infecties:

- In een ader (intraveneus) als infuus: 1500 mg – 3000 mg elke 24 uur. Bij ernstige infecties maximaal 6 gram elke 24 uur.

Gebruik bij kinderen vanaf 3 maanden tot 11 jaar en tot maximaal 50kg lichaamsgewicht

Dosering

Infecties:

- In een ader (intraveneus) als infuus: 30 tot 120 mg/kg afhankelijk van de ernst van de infectie.

Wijze van toediening

De cassette waarin de meropenem wordt geleverd zal het geneesmiddel in ongeveer 24 uur afgeven.

De coldpacks waarmee de cassette gekoeld wordt moeten iedere 8 tot 12 uur verwisseld worden met koude coldpacks.

Bij behandeling met meropenem dient de leverfunctie regelmatig gecontroleerd te worden.

Bij een stoornis aan de nieren, moet de dosering soms worden aangepast.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van meropenem hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van meropenem moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

- Maagpijn
- Misselijkheid
- Overgeven
- Diarree
- Hoofdpijn
- Huiduitslag, jeukende huid
- Pijn en ontsteking
- Verhoogde hoeveelheid bloedplaatjes in uw bloed
- Veranderingen in bloedtesten, zoals leverfunctietesten

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

- Ernstige overgevoelighedsreacties; ernstige huiduitslag, blaren, loslaten van de huid anafylactische shock, zwelling van gezicht, lippen, tong of andere lichaamsdelen, kortademigheid. Stop bij deze verschijnselen direct met de toediening van meropenem en neem direct contact op met uw arts!
- Veranderingen in uw bloed (verlaagd aantal bloedplaatjes verlaagd aantal witte bloedlichaampjes, verhoogd bilirubine)
- Verandering in bloedtesten, zoals nierfunctietest
- Tintelend gevoel
- Infecties in de mond of vagina die door een schimmel worden veroorzaakt
- Ontsteking van de darmen met diarree
- Pijnlijke aders waar meropenem wordt toegediend

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

- Toevallen (stuipen)

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Ernstige overgevoelighedsreacties met koorts, huiduitslag en veranderingen in bloedtesten (onder andere leverenzymen en eosinofilie) (DRESS-syndroom)
- Schade aan rode bloedcellen; rode of bruine urine, buiten adem zonder aanleiding. Neem bij deze verschijnselen direct contact met uw arts op.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Meropenem cassette is 5 dagen houdbaar in de koelkast, waarbinnen het toegediend moet worden met gekoelde pomp.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Meropenem (bereid uit RVG-nummer: 119963)

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Water voor injecties
- Natriumchloride 0,9%
- Natriumcarbonaat

Hoe ziet meropenem eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Meropenem wordt geleverd in cassettes van 100 ml of 250 ml. Een verpakking bevat een of meerdere cassettes.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2024