

Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u en uw kind.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is kaliumjodide en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u of uw kind dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u of uw kind dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u of uw kind dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is kaliumjodide en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kaliumjodide is een geneesmiddel dat bij schildklierproblemen worden gegeven.

Kaliumjodide wordt gebruikt bij volwassenen voor:

- Ter voorbereiding op een schildklieroperatie (strumectomie)
- Een infectie met een schimmel (sporotrichose)

Kaliumjodide wordt gebruikt bij kinderen vanaf 12 jaar voor:

- Preventief bij een behandeling met straling (schildklierblokkade bij therapie met radioactief jodium)

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U of uw kind bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U of uw kind heeft een onbehandelde te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie).
- U of uw kind heeft de ziekte van Dühring, een zeldzame blaarvormende huidziekte.
- U of uw kind heeft hypocomplementaire urticariele vasculitis, huidaandoening waarbij galbulten optreden die langer dan 24 uur aanhouden.
- U bent zwanger.
- U geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u of uw kind een onregelmatig vergrote schildklier (multinodulair struma) heeft.
- Als u of uw kind de ziekte van Graves heeft.
- Als u of uw kind een chronische ontsteking van de schildklier heeft (thyreoïditis van Hashimoto).
- Als u of uw kind een schildklierfunctiestoornis heeft vlak na de bevalling (post partum lymfocytair thyreoïditis).
- Als u of uw kind mogelijk een tumor aan de schildklier heeft.
- Als u of uw kind een ontsteking aan de schildklier heeft.
- Als u of uw kind blokkade van de luchtpijp (tracheaobstructie) heeft.
- Als u of uw kind een ontsteking van de schildklier heeft (subacute thyreoïditis) heeft.
- Als u of uw kind een verminderde werking van de nieren of bijnieren heeft.
- Als u of uw kind diabetes mellitus heeft.
- Als u of uw kind uitdroging of hittekramp heeft.

Gebruikt u of uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u of uw kind naast kaliumjodide nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Afgeraden wordt om kaliumjodide gelijktijdig te gebruiken met kaliumsparende diuretica als spironolacton, ACE-remmers als enalapril en angiotensine-II antagonisten als losartan. Omdat dit een verhoogd risico geeft op een te hoog kaliumgehalte in het bloed.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Kaliumjodide mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Kaliumjodide wordt na absorptie omgezet in jodium dat de placenta gemakkelijk passeert. De foetale schildklier neemt vanaf ongeveer de twaalfde zwangerschapsweek jodium op. Jodiden kunnen bij de foetus de schildklierfunctie onderdrukken en de schildklier vergroten.

Borstvoeding

Kaliumjodide mag niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Jodium gaat over in de moedermelk en kan daar stapelen. Bij de zuigeling zijn onderdrukking van de schildklierfunctie en vergroting van de schildklier gemeld.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Ter voorbereiding op een schildklieroperatie (strumectomie):

- Oraal: 50 tot 250 mg, 3 maal per dag, gedurende 10 tot 14 dagen voorafgaand aan de operatie.

Bij infectie met een schimmel (sporotrichose):

- Oraal: 250 tot 300 mg 3 maal per dag, daarna verhogen tot 3 tot 6 gram per dag. Alternatief is 2 tot 3 gram per dag of eerst 500 tot 1500 mg per dag, waarna wordt verhoogd naar 4 tot 6 gram per dag. Behandelen tot 4 weken na genezing.

Wijze van toediening

Neem zittend of staand in met veel water, tijdens of vlak na het eten.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dosering

Preventief bij een behandeling met straling (schildklierblokkade bij therapie met radioactief jodium):

Kinderen vanaf 12 jaar:

- Oraal: 130 mg per dag, te beginnen 48 uur voor toediening het radioactief geneesmiddel, tot en met dag 7 (totaal 10 dagen). De nucleaire geneeskundige kan adviseren om eerder te starten.

Wijze van toediening

Neem zittend of staand in met veel water, tijdens of vlak na het eten.

Heeft u of uw kind te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u of uw kind per ongeluk te veel van kaliumjodide heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u of uw kind vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van kaliumjodide moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Allergische reacties: overgevoeligheidsreacties; meestal licht tot matig, soms afhankelijk van de dosis, zoals opgezwollen speekselklieren, hoofdpijn, benauwdheid door verkramping van de luchtwegen (bronchospasme) en maag-darmklachten
- Ontsteking van de speekselklieren
- Schildklierproblemen door jodium (ziekte van Graves, ziekte van Hashimoto, toxisch nodulair struma, thyreoïditis, vergrote schildklier met of zonder myxoedeem)
- Te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie)
- Te snel werkende schildklier (hypothyreoïdie)
- Overactieve schildklier
- Tijdelijke huiduitslag

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u of uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Kaliumjodide capsules kunnen verkleuren bij bewaren in het licht en wanneer de verpakking regelmatig wordt geopend. Verkleuring van de capsules heeft geen invloed op de werkzaamheid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Kaliumjodide

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Magnesiumoxide (zwaar)
- Primojel capsulevulmengsel FNA

Hoe ziet kaliumjodide eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Kaliumjodide wordt geleverd als capsule en is per stuk verpakt in een blisterverpakking. Kaliumjodidecapsules worden per 10 stuks verpakt in een zalfpot.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2026