

Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan uw kind voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als uw kind.
- Krijgt uw kind last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met arts of apotheker van uw kind.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is atropinesulfaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken of moet uw kind er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt uw kind dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is atropinesulfaat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Atropinesulfaat is een stof, die werkt in het zenuwstelsel en hoort tot de zogenaamde groep parasymphaticolytica. Dit zijn stoffen die de werking van de lichaamseigen stof acetylcholine tegengaan. Acetylcholine is een signaalstofje in het zenuwstelsel en is belangrijk voor de werking van veel inwendige organen zoals het hart, de bloedsomloop, longen en maagdarmsstelsel.

Atropinesulfaat wordt gebruikt voor:

- Medicatie voor een bepaalde ingreep
- Medicatie tegen (spier)krampen (spasmolyticum)

2. Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken of moet uw kind er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken?

- Uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Uw kind een auto-immuunziekte heeft, genaamd het syndroom van Sjögren.
- Uw kind een ongecontroleerde hoge oogdruk (nauwekamerhoekglaucoom) heeft.
- Uw kind een verstopping in maag of darmen (obstructieve aandoening van het maagdarmskanaal) heeft.
- Uw kind stilgelegde darmen (paralytische ileus) heeft, behalve bij behandeling hiervan in de laatste levensfase.
- Uw kind een versnelde hartslag (tachycardie) heeft.
- Uw kind plots veel bloed verliest en problemen met de bloedsomloop (acute bloeding bij instabiele cardiovasculaire status) heeft.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt uw kind naast atropinesulfaat nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan de arts of apotheker van uw kind.

Waarop moet uw kind letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens over atropinesulfaat bij de zwangerschap.

Borstvoeding

Het wordt afgeraden om borstvoeding te geven tijdens het gebruik van atropinesulfaat.

Is uw kind zwanger, denkt uw kind zwanger te zijn, wilt uw kind zwanger worden of geeft uw kind borstvoeding? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind voordat uw kind dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. Hoe gebruikt uw kind dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals de arts of apotheker van uw kind dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met arts of apotheker van uw kind.

Dosering

Voor de ingreep:

- Via de mond: 1mnd-18jr: 0,01-0,02 mg/kg eenmalig. Maximum dosis: 0,6 mg/dosis. 30-60 minuten voor de ingreep.

Tegen (spier)krampen (als spasmolyticum):

- Via de mond: 1mnd-18jr: 0,01 mg/kg/dosis, zo nodig elke 4-6 uur. Maximum dosis: 0,4 mg/dosis.

Heeft uw kind te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer uw kind per ongeluk te veel atropinesulfaat heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met arts of apotheker van uw kind voor advies.

Bent u vergeten dit middel aan uw kind te geven?

Geef geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Hoofdpijn, duizeligheid
- Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag
- Verstopping (obstipatie), misselijkheid en braken
- Brandend maagzuur (reflux), remming van maagzuurproductie
- Waarnemingen (zien, horen, ruiken, voelen) van dingen die er niet zijn (hallucinaties), slaperigheid, slapeloosheid, onrustig gevoel (nervositeit)
- Smaakverlies
- Verhoogde temperatuur
- Wazig zien, grote pupillen, moeite met kijken, verhoogde oogdruk, gevoeligheid voor het licht (fotofobie)
- Coördinatiestoornissen
- Psychose
- Snelle hartslag (tachycardie), hartkloppingen, voorbijgaande verergering trage hartslag
- Droge mond, verminderd zweten
- Problemen met plassen, niet kunnen plassen (urineretentie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp. De geopende fles is 6 maanden houdbaar (binnen de Exp.).

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer. Donker bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Atropinesulfaat

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Sorbitol 70% kristalliseerbaar
- Methylparahydroxybenzoaat
- Propyleenglycol
- Frambozen essence
- Zoutzuur
- Water voor injectie

Hoe ziet atropinesulfaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Atropinesulfaat wordt geleverd als flacon van 30 ml met een doseerspuit. Eén verpakking bevat 16 flacons.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Apotheek Spaarne Gasthuis
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2026